## AVERTISSEMENTS AGRICOLES

TECHNIQUE DES STATIONS DLP11-8-8079463 D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN

PUBLICATION PÉRIODIQUE \_\_\_

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON'

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

la plus grando vigilance doit ŝtre apportée

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL 34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42 De mante del des de la companya de la compan

ABONNEMENT ANNUEL Régisseur de recettes de la D.D.A. Nº 14 - C. a det 19865238-57

donne lieu à des interventions localisées. au repărage de degâts éventuels de Cloud et du min venes. L'utilisation de produits à e d'asinghos ou de méthouyl est concel Ve Vithidathion peut également être

OIDIUM -

L'Oïdium a dû être combattu méthodiquement cette année car sa recrudescence était à redouter (bulletin n° 7, du 30 avril). Nos prescriptions de lutte ont été rappelées à plusieurs reprises. Les échecs constatés sont liés principalement à l'utilisation d'appareils mal adaptés, n'apportant pas la protection nécessaire au niveau des grappes. De plus, la présence permanente du vent n'a pas facilité l'exécution des traitements.

Avant véraison il est encore possible de lutter contre l'Oidium à l'aide d'une pulvérisation à base de soufre, ou de produit de même efficacité. Si les conditions climatiques le permettent (abaissement des températures) on pourra procéder, avant véraison, à un soufrage. L'utilisation de permanganate, pour enrayer des attaques très graves, doit cesser, sur raisins de table, dix jours avant véraison. L'intervention doit être prococe, de la remotate de la coloration apasstée des feuillier.

CICADELLES -

De nouvelles manifestations de ces ravageurs sont signalées. Aussi convient-il d'effectuer le traitement sur l'ensemble du feuillage, avec un litrage suffisant, dans les vignes sujettes aux attaques de ces insectes.

De nombreux roduits peuvent être utilisés.

ACARIENS -

Les conditions climatiques de la quinzaine écoulée ont favorisé les pullulations des acariens. Recourir actuellement à l'emploi d'acaricides de contact et assurer le traitement sur l'ensemble du feuillage.

ARBRES FRUITIERS /

PECHER - ABRICOTIER -

TWIGING ATMORDS A O THEO ?

Après récolte, les traitements contre l'Oidium doivent être poursuivis, afin d'éviter l'infection généralisée du feuillage et ultérieurement des bourgeons.

PRUNIER - ABRICOTIER -

La lutte contre les rouilles est à réaliser à l'aide de fongicides de synthèse. 1200 exemple:

PECHER -

Tordeuse orientale : Les interventions contre ce ravageur doivent être menées avec rigueur pour éviter l'apparition de dégâts dommageables. 2 à 3 traitements sont nécessaires sur pêches tardives à récolter après le 25 août. Un seul est à appliquer pour les pêches à récolter après le 15 août.

Les jeunes arbres en formation et les sujets en pépinière doivent être protégés.

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Place Chaptal MONTPELLIER - Le Directeur : XXXXXXXX

Nº d'inscription P/P 531 A.D

## POMMIER -

Carpocapse: Ce ravageur s'est manifesté depuis quelques jours dans les vergers non traités. Les conditions sont favorables au déroulement de son cycle, aussi pour éviter des dégâts sur fruits il convient d'assurer dès que possible une protection.

Tordeuses de la pelure: Dans les vergers où la lutte contre le Carpocapse donne lieu à des interventions localisées, la plus grande vigilance doit être apportée au repérage de dégâts éventuels de Capua et de mineuses. L'utilisation de produits à base d'azinphos ou de méthomyl est conseillée. Le méthidathion peut également être employé.

/ - MULGIO

SORSOESDITION BE THE OFFICE / SCULTURES LEGUMIERES of / OF STATE BY A MULGIO

THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO

La protection doit être assurée contre la <u>Teigne du poireau</u>, les <u>aleurodes</u>, et le <u>thrips de l'oignon</u>, ravageurs dont l'activité est importante en cette période de l'année.

Le <u>Mildiou de la tomate</u> doit être surveillé, car son extension peut être favorisée par des arrosages intempestifs. Il en est de même du <u>Mildiou de l'Eignon</u>.

Rappelons que le <u>Thrips de l'oignon</u> est un petit insecte de couleur jaune paille. Les pullulations peuvent entraîner un dessèchement des feuilles et des gaines. L'intervention doit être précoce, dès le repérage de la coloration argentée des feuilles.

Les <u>Noctuelles</u> (Heliothis armigera) sont signalées dans les cultures de tomates des Costières du Gard. Le traitement est conseillé dès le repérage des première chenilles avant leur pénétration dans les fruits.

De nombreus roduits peuvent Stre utilisis.

Respecter strictement les délais d'emploi avant récolte

d'évicer l'infection généralisée du feuillage et ulterieursdent des beurgeours

avec rigueus pour Sviter l'apparition du dégâts downageables. 2 à 3 trairements sont nécessaires sur pêches tardives à récolter après le 25 août. Un seul est 3 appliquer

Après récolte, les traitements contra l'Ofdian doivent ôtra poursuivis, afin

Dardenge orientale : Les interventions contre co ravageur doivent firu mentes

Les jeutes arbres en formation et les sujets en pépinière doivent être -

Pour le CHEF de CIRCONSCRIPTION L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE ADJOINT,

pour les péchez à ricolter après le 15 août.

PRUBLER - ABRICOTIES -

G. THEISSEN

Tirage du 7 août 1980 1200 exemplaires

O.A. Co. Ty go mineral life